

Enquête accidentologie

2009 - 2010



Barotraumatismes

- oreilles : 3
- sinus : 1
- surpression pulmonaire : 5

Désaturation

31


Faute de procédure : 1

Accidents de plongée

Autres

- PC recycleur : 2
- Œdème pulmonaire : 1
- Incident : 2


31 ADD



** Paresthésies isolées, malaise, atteinte cutanée*

31 ADD

- Age moyen : 42.4 ans
- 3 femmes / 28 hommes (9.6 %)
- $P3 + P4 + E2$: 15 / 31 !



31 ADD

- Des plongeurs en bonne santé
- Peu d'antécédents
- IMC moyen : 25.7 (limite surcharge pondérale)
- D'autres ADP précédemment : 3 cas


31 ADD

➤ Profondeur : **33.7 m** Durée fond : **28.5 min**



Durée moyenne des paliers : **6 min**

1 seul plongeur n'a pas respecté sa procédure de décompression

3 pannes d'air




31 ADD



31 ADD

- Apparition des premiers signes : max 5h30 après la sortie de l'eau :



31 ADD

- Entre l'apparition des premiers signes et l'arrivée au caisson : 7 heures en moyenne
 - 1h => 4 jours !
 - En excluant les Bends : 5.6 heures (1h => 18 heures)
- Raisons :
 - Une erreur d'orientation (urgences)
 - Négligence des signes : bend +++
- Evolution :
 - Récupération dans tous les cas

Conclusion

- Net déclin d'activité en 2010
 - Cf les deux bilans précédents :
 - Plonger en forme +++
 - L'accident n'arrive pas qu'aux autres
 - Respect des procédures dans la plupart des cas ...
 - ⇒ Analyser son état de forme (fatigue, stress...), l'accumulation de plongées, un profil limite (remontées très lentes)
- 3 pannes d'air tout de même !